


VASKULÁRNÍ OKLUZE SPOJENÉ S APLIKACÍ DERMÁLNÍCH VÝPLNÍ A JEJICH ŘEŠENÍ

Pokud si lékař není jistý, že problém zvládne sám, je třeba, aby požádal pomoc kolegu. Komplikace musí být rychle vyřešena.



DALŠÍ FARMAKOLOGICKÝ MANAGEMENT

Aspirin – 100-300 mg denně, v případě alergie Klopido-grel v dávce 300 mg

Antibiotika – zvážit, hlavně při větší ischemii (prevence sekundární infekce, např. Augmentin)

Steroidy – pouze v klinické indikaci (mohou ohrozit hojení ran)

Management péče o rány

Léčba bolesti podle potřeby

DALŠÍ MOŽNOSTI LÉČBY

Hyperbarická oxygenoterapie (HBOT)

Nízkomolekulární heparin

Perorální vazodilatátory

Sildenafil- není prokázána účinnost

SLEDOVÁNÍ PACIENTA, KONTROLY A MONITOROVÁNÍ

SPOLÉČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP



SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE
OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP